

4. ข้อควรปฏิบัติกรณีหกร้าวไฟ lod หรือเกิดเพลิงไหม้

- 4.1 ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในการณีที่หกร้าวไฟ lod หรือร้าวไฟ lod อยพกนออกจากริเวณที่เกิดอุบัติเหตุหรือบริเวณที่ร้าวไฟ lod ทันที
- 4.2 วิธีป้องกันภัยของบุคคล สวนอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบทุก รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา
- 4.3 วิธีการทำความสะอาดหลังการป่นเปื้อน หรือร้าวไฟ lod หลีกเลี่ยงการทำให้ฟุ่นฟุ้งกระจาย ระยะอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกร้าวไฟ lod หลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว คลุมด้วยปูนขาวแห้ง ตราย หรือโซดาแอ๊อก เก็บในภาชนะที่ปิดโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟและเคลื่อนย้ายออกสู่ที่โล่ง

4.4 สารดับเพลิงที่เหมาะสม Carbon dioxide ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม

4.5 ความเสี่ยงเฉพาะ อันตรายเฉพาะ ปล่อยควันพิษออกมายได้สภาวะที่เกิดไฟ ซึ่งใหม่ไฟได้

4.6 อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผลิตเพลิง สวนเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวน้ำและดวงตา

5. ข้อควรปฏิบัติ

5.1 ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณที่ทำงาน โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและปริมาณสารอันตรายที่ใช้ ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกันโดยตัวแทนจำหน่าย

5.2 อ่อนหายน้ำเจ้าผุนเข้าไป ระวังอ่อนหายน้ำเจ้าตา โดยผิวน้ำ หรือเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือช้าๆ หลายครั้ง

5.3 เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที หากรีบป้องกันผิวน้ำ ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร ห้ามสูดดมสาร ห้ามกินอาหารหรือดื่มน้ำในบริเวณที่ทำงาน

5.4 ทำความสะอาดเสื้อผ้า รองเท้า ที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่

5.4 เมื่อถูกผิวน้ำ ล้างทันทีด้วยโพลีอิทธิลีนไกลคอล 400 ตามด้วยน้ำปริมาณมาก ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี

5.5 การเก็บรักษาต้องปิดฝาให้สนิท เก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลาไฟ ใช้และเก็บภายใต้ในตู้เรเงน เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

6. การปฐมพยาบาล

6.1 เมื่อสูดดมสาร ถ้าสูดดมเข้าไป ให้ขยับผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้การช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบาก ให้ออกซิเจน

6.2 เมื่อสัมผัสสาร ในกรณีที่ถูกผิวน้ำ ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร ไปพับแพทช์

6.3 เมื่อสารเข้าตา ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้น้ำมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง ไปพับแพทช์

6.4 เมื่อกลืนกิน เมื่อกลืนกิน ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ ไปพับแพทช์ทันที